

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลงาน

อัตรา

2. เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

▶ 2.1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=67e41dbb1ce5d844d49f6b7b10e30d01)

▶ 2.2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=1b60d68b1cb5b003fcb38a4a0e4027b)

5. การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/formatg.php&id=eefd31ab993640a98206360a843fbe37)

13. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง

▶ 13.1. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=e9e461e793e8258f47d46d6956f12832)

3,165 1,505 47.55

▶ 13.2. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=b57439ff27302ade8c38d1dd189644a4)

16,418 11,539 70.28

25. ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม

▶ 25.1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=7ac059f4e4e3d08750d2ee23600556af)

3,342 242 7.24

▶ 25.2. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke: I60-I62) (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=db98b653287b753aab3b86222589f12e)

824 146 17.72

▶ 25.3. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63) (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=fc4ef4b0a87cd045a5d9defa44f15de8)

1,891 79 4.18

31. อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=0acb84a5c774c129dfc849a742d766)

6,029 20 3.32

32. ร้อยละการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง มีกิจกรรม Family Meeting และมีการทำ Advance Care Planning (ACP) ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=a67ee74a4c0ff3c775b591be4ec80086)

3,161 1,229 38.88

33. ร้อยละของผู้ป่วยนอกที่ได้รับการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก [นับรวมแผนจีน(U78x - U79x) แต่ไม่นับรวม U77x] (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=50980b81323b2978d9ed4c4b353c58bc)

3,247,827 469,815 14.47

34. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/formatg.php&id=706b605192b49d385ba044350af9c46a)	25,541	25,434	99.58
35. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/formatg.php&id=f98aa818686df571817c33e0168966a2)			
36. อัตราตายของผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=00366a85bd3c2b6932a228df29137252)	2,147	763	35.54
38. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI และการให้การรักษามาตรฐานเวลาที่กำหนด			
▶ 38.1. อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=9fb3a84cf0feae3615a63f476252bf34)	381	7	1.84
▶ 38.2. ร้อยละของการให้การรักษาผู้ป่วย STEMI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=12d5b6eef67669da17758ef281915cbb)	260	52	20.00
42. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<5 ml/min/1.73m²/yr (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=d843f25a088253c22344d771113cf409)	12,049	7,872	65.33
50. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 (ทั้งที่ ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=4709220e55ae6c91c872e08b4ac2498c)	4,677	131	2.80
68. ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล			
▶ 68.1. ร้อยละความถูกต้อง ของข้อมูล (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=037d8e641ac9cc5460c8bdd5288ca17c)			
▶ 68.2. ร้อยละความสอดคล้อง ของข้อมูล (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=db32f02455085b45fbb5197da873c693)			
▶ 68.3. ร้อยละความครบถ้วนสมบูรณ์ ของข้อมูล (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=9d0527cf6ea4060e8039286d8c08c8ba)	5,833,471	5,817,732	99.73
▶ 68.4. ร้อยละความทันเวลา ของข้อมูล (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=df161b908d806233af1e55ee0df57ad4)	1,302	920	70.66
▶ 68.5. สรุปผลการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=fe9ab8e86eb04a3848c754e5dd6a755b)			
▶ 68.6. ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=1 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=da3fc4ca3d7a74a09729f4e6e843a4da)			

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลงาน	อัตรา
1. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=9 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=e9e461e793e8258f47d46d6956f12832)	3,165	1,505	47.55
2. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=9 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=0f23318497737af76b19e98304dbcec7)	69,501	58,961	84.83
3. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL และมีค่า LDL < 100 mg/dl (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=9 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=ab10d2cee3bd010cd0aab0148bbd0c6c)	58,961	31,074	52.70
4. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=9 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=137a726340e4dfde7bbbc5d8aeec3ac3)	69,501	15,532	22.35
5. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีความดันโลหิตควบคุมได้ตามเกณฑ์ (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=9 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=ac9019f14a00b66984dd9efc3afc06a6)	69,501	33,932	48.82
6. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วน [BMI >= 25 กก./ตร.ม.)] ลดลงจากงบประมาณที่ผ่านมา (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=9 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=735890fbb28aa2989052648af8cb4600)			
7. ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันในผู้ป่วยเบาหวาน (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=9 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=b06544333648315e83c83445a62dd94e)	69,501	1,366	1.97
8. ร้อยละของผู้ที่มีความดันโลหิต $\geq 180/110$ มม.ปรอท จากการคัดกรอง ได้รับการวินิจฉัย (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=9 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=fbd82877aceaa4367f8d33c59bc647d6)	585	92	15.73
9. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=9 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=b57439ff27302ade8c38d1dd189644a4)	16,418	11,539	70.28
10. ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=9 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=2e3813337b6b5377c2f68affe247d5f9)	119,322	68,866	57.71
11. ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=9 &flag_kpi_year=2022&source=kpi/kpi_ckd2.php&id=0f6df79c2f8887f50d7879b5fe91c080)	103,147	72,870	70.65
12. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่มี CVD Risk $\geq 20\%$ หลังได้รับการปรับเปลี่ยนความเสี่ยงแล้วมี CVD Risk ลดลง (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=9 &flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=cb65de9ec5fa4e5987b43da669b2280d)	875	412	47.09

13. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง ที่เป็น CKD 3-4 ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเป้าหมาย (././reports/report_kpi.php?flag_kpi_level=9
&flag_kpi_year=2022&source=pformatted/format1.php&id=752f4de6e90d3e41b3cb8f8104b2e8bd)

10,734**7,041****65.60**











ชื่อรายงาน

เป้าหมาย



ผลงาน


อัตรา

1. หญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด


▶ 1.1. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=1c1b8e24aff59258a806f122e264031e)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=1c1b8e24aff59258a806f122e264031e)	23	23	100.00
▶ 1.2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์ (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=bd63b8d99f7054560fc9c3b96f39c13)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=bd63b8d99f7054560fc9c3b96f39c13)	22	21	95.45
▶ 1.3. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=422edc9d4d81d5c943a8ca9029f20e78)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=422edc9d4d81d5c943a8ca9029f20e78)	93	93	100.00
▶ 1.4. ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=f50124b9cbc6636272844273980ca42e)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=f50124b9cbc6636272844273980ca42e)	39	16	41.03
▶ 1.5. ร้อยละ Early ANC (Workload) (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=c46937050a3fa5198e5cd139578a3732)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=c46937050a3fa5198e5cd139578a3732)	106	87	82.08
▶ 1.6. จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์(Workload) (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=e92321deb9e2bc3b24d453d6122b8827)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=e92321deb9e2bc3b24d453d6122b8827)			
▶ 1.7. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์ครบ 8 ครั้งตามเกณฑ์ (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=a35f2d61161b86725cccf061b5cbea04)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=a35f2d61161b86725cccf061b5cbea04)	22	5	22.73
▶ 1.8. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=5087190fa0a3c28974fdde7fd1443d5e)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=5087190fa0a3c28974fdde7fd1443d5e)	22	1	4.55

2. หญิงตั้งครรภ์ >> แม่วัยรุ่น


▶ 2.1. ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=4f7d8042fb0a064b25f29a48f6ccd23f)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=4f7d8042fb0a064b25f29a48f6ccd23f)	1	0	0.00
▶ 2.2. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=96e32d575103002017729beef422b5e3)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=96e32d575103002017729beef422b5e3)	1	0	0.00
▶ 2.3. การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (././reports/report.php?source=pformatted/formatg.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=eefd31ab993640a98206360a843fbe37)			

 (../warehouse/export_s_txt.php?id=eefd31ab993640a98206360a843fbe37)


▶ 2.4. การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี (../reports/report.php?source=pformatted/formatg.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=782a6749bd5608ecaf7ab67f0e3f3abd)

 (../warehouse/export_s_txt.php?id=782a6749bd5608ecaf7ab67f0e3f3abd)

▶ 2.5. จำนวนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ (กมรส.) (../reports/report.php?source=pformatted/format4.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=4a59b7a2f1ca62eb92d7c88e1ee9546d)


 (../warehouse/export_s_txt.php?id=4a59b7a2f1ca62eb92d7c88e1ee9546d)

▶ 2.6. จำนวนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่คลอดบุตร (กมรส.) (../reports/report.php?source=pformatted/format4.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=33030aadb48bb766f602bf51a65c71b7)


 (../warehouse/export_s_txt.php?id=33030aadb48bb766f602bf51a65c71b7)

3. หญิงตั้งครรภ์ >> เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด (Preterm)


▶ 3.1. หญิงตั้งครรภ์เดี่ยวสัญชาติไทย อายุครรภ์ 15-25 สัปดาห์ ได้รับการตรวจวัดความยาวปากมดลูก (../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=558ea584f4a02ff17f227a6347de117d)

 (../warehouse/export_s_txt.php?id=558ea584f4a02ff17f227a6347de117d)


▶ 3.2. หญิงตั้งครรภ์เดี่ยวสัญชาติไทย อายุครรภ์ 15-25สัปดาห์ ได้รับการตรวจวัดความยาวปากมดลูก(สปสข.) (../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=0fd5d12b730e7122f13cb9de78c79fe1)

 (../warehouse/export_s_txt.php?id=0fd5d12b730e7122f13cb9de78c79fe1)


▶ 3.3. หญิงตั้งครรภ์เดี่ยวที่ตรวจวัดความยาวปากมดลูก ที่พบปัจจัย ด้านอายุ/ด้านฐานะ (../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=aa712dc58f020c38776e60dc884a999a)

 (../warehouse/export_s_txt.php?id=aa712dc58f020c38776e60dc884a999a)


▶ 3.4. รายงานสรุปผลการตรวจวัดความยาวปากมดลูกและการได้รับยา (../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=dc3e34d3b86b6390e10848afd7c7ffb40)

 (../warehouse/export_s_txt.php?id=dc3e34d3b86b6390e10848afd7c7ffb40)


▶ 3.5. หญิงตั้งครรภ์เดี่ยวที่มีความยาวปากมดลูกสั้น ได้รับการติดตามภายใน 1-4 สัปดาห์ (../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=3abc050a130bfdbeb5e921a9fa7ff2ce)

 (../warehouse/export_s_txt.php?id=3abc050a130bfdbeb5e921a9fa7ff2ce)


▶ 3.6. หญิงตั้งครรภ์เดี่ยวที่มีความยาวปากมดลูกสั้น ได้รับการติดตามภายใน 1-4 สัปดาห์(สปสข.) (../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=b551c2591c4601dad2502c870c7e0a47)

 (../warehouse/export_s_txt.php?id=b551c2591c4601dad2502c870c7e0a47)


▶ 3.7. ร้อยละหญิงไทยคลอดก่อนกำหนดในบึงบรประมาณ (../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=ecdbfc8b4725386c34623ce99f0f4b8d)





 (../warehouse/export_s_txt.php?id=ecdbfc8b4725386c34623ce99f0f4b8d) **13** **0** **0.00**

▶ 3.8. หญิงไทยคลอดก่อนกำหนดในบึงบรประมาณ ที่พบปัจจัย ด้านอายุ/ด้านฐานะ (../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=b89de4bbf662072bab1e30196ddd22f2)

 (../warehouse/export_s_txt.php?id=b89de4bbf662072bab1e30196ddd22f2)

▶ 3.9. หญิงตั้งครรภ์เดี่ยวสัญชาติไทย ที่เคยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนดในครรภ์ก่อนได้รับยาเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=b9c960531212675ca1ea2ca0395885b9)




 (../warehouse/export_s_txt.php?id=b9c960531212675ca1ea2ca0395885b9)

- ▶ 3.10. หญิงตั้งครรภ์เดี่ยวสัญชาติไทย ที่เคยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนดในครรภ์ก่อนได้รับการตรวจวัดความยาวปากมดลูก
 (././reports/report.php?
 source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=5ee8bbfcc07cf57cd724b0d3a431c229)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=5ee8bbfcc07cf57cd724b0d3a431c229)
- ▶ 3.11. หญิงตั้งครรภ์เดี่ยวสัญชาติไทย ที่เคยมีประวัติการคลอดก่อนกำหนดในครรภ์ก่อนได้รับการตรวจติดตามต่อเนื่องใน 8 สัปดาห์
 (././reports/report.php?
 source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=9afe96c806b56ab8a2f1f4aab1486eb8)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=9afe96c806b56ab8a2f1f4aab1486eb8)
- ▶ 3.12. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์สัญชาติไทย อายุครรภ์ 15-25 สัปดาห์ ได้รับการตรวจวัดความยาวปากมดลูก (././reports/report.php?
 source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=e40d9ed5bc065a7d0a1971d7c37e08b2)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=e40d9ed5bc065a7d0a1971d7c37e08b2) **32** **0** **0.00**
- ▶ 3.13. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์สัญชาติไทย ได้รับการประเมินการพัฒนาทักษะความรู้ด้านสุขภาพ (HL) (././reports/report.php?
 source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=5fde2245f87d30332dc8eccb3b35da2c)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=5fde2245f87d30332dc8eccb3b35da2c) **93** **0** **0.00**

4. เด็กแรกเกิด - 12 เดือน

- ▶ 4.1. ร้อยละของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม (././reports/report.php?
 source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=ce4f9fcd9cd41b6cb2f79b2440a6f4cc)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=ce4f9fcd9cd41b6cb2f79b2440a6f4cc) **14** **0** **0.00**
- ▶ 4.2. ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว (././reports/report.php?
 source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=4164a7c49fcb2b8c3ccca67dcdf28bd0)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=4164a7c49fcb2b8c3ccca67dcdf28bd0) **81** **73** **90.12**
- ▶ 4.3. เด็กไทยอายุ 6-12 เดือนได้รับการเจาะเลือดตรวจ Hct/CBC (././reports/report.php?
 source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=ea05de994e57ee180af5652f2852e9c9)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=ea05de994e57ee180af5652f2852e9c9)
- ▶ 4.4. เด็กไทยอายุ 6-12 เดือนได้รับการเจาะเลือดตรวจ Hct/CBC(สปสข.) (././reports/report.php?
 source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=f8621538335509ee62982580543add5a)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=f8621538335509ee62982580543add5a)
- ▶ 4.5. เด็กไทยอายุ 6-12 เดือน ที่ตรวจคัดกรองและพบโลหิตจาง (././reports/report.php?
 source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=ac2abec1ece639a72ceacd980898b5b2)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=ac2abec1ece639a72ceacd980898b5b2) **7** **2** **28.57**


5. พัฒนาการเด็ก >> DSPM


- ▶ 5.1. ผลการดำเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp (././reports/report.php?
 source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=2238b7879f442749bd1804032119e824)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=2238b7879f442749bd1804032119e824) **1,079** **143** **13.25**
- ▶ 5.2. ผลการดำเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp ช่วงรณรงค์ (././reports/report.php?
 source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=8f756c2dbc5f525f853d898dfaef0c14)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=8f756c2dbc5f525f853d898dfaef0c14)
- ▶ 5.3. ผลการคัดกรอง Social Risk พัฒนาการเด็ก (././reports/report.php?
 source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=890c7adff77936af39aa9c76f6c15e35)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=890c7adff77936af39aa9c76f6c15e35)

- ▶ 5.4. ทารกแรกเกิดที่ขาดออกซิเจน Apgar Score ต่ำกว่า 7 ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ DSPM (./../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=3b5c24663c7960bf20e28c865e167907) (./../warehouse/export_s_txt.php?id=3b5c24663c7960bf20e28c865e167907)
- ▶ 5.5. ทารกน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ DSPM (./../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=1be19835c27a06c85f4652391f568d3f) (./../warehouse/export_s_txt.php?id=1be19835c27a06c85f4652391f568d3f)
- ▶ 5.6. ทารกคลอดมีชีพในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ DSPM (./../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=d686434f2ff3ef0dedb047d7ebc3e279) (./../warehouse/export_s_txt.php?id=d686434f2ff3ef0dedb047d7ebc3e279) **22** **6** **27.27**
- ▶ 5.7. เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ DSPM (./../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=42d07f6b856170ea71d6ad3110ccbb0c) (./../warehouse/export_s_txt.php?id=42d07f6b856170ea71d6ad3110ccbb0c) **604** **93** **15.40**
- ▶ 5.8. ทารกแรกเกิดที่มีปัจจัยเสี่ยง ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ DSPM (./../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=6f0cfed76d1d82069aeea3201db028aa) (./../warehouse/export_s_txt.php?id=6f0cfed76d1d82069aeea3201db028aa) **614** **95** **15.47**
- ▶ 5.9. ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย (สมวัยครั้งที่สอง) (./../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=b771be7c8251286d36024538aa99e341) (./../warehouse/export_s_txt.php?id=b771be7c8251286d36024538aa99e341)


6. พัฒนาการเด็ก >>TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น


- ▶ 6.1. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือนที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น (./../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=023dcdc36f90b6b070358fbc6727c768) (./../warehouse/export_s_txt.php?id=023dcdc36f90b6b070358fbc6727c768) **2** **0** **0.00**
- ▶ 6.2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น (./../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=2fe4b69b0d279a4d2a38ed24c4f08e98) (./../warehouse/export_s_txt.php?id=2fe4b69b0d279a4d2a38ed24c4f08e98) **6** **4** **66.67**
- ▶ 6.3. เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น (Work Load) (./../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=8b1344d910043725179665c82c9d38d3) (./../warehouse/export_s_txt.php?id=8b1344d910043725179665c82c9d38d3) **20** **1** **5.00**
- ▶ 6.4. เด็กพัฒนาการล่าช้า ที่ได้รับการวินิจฉัยจำแนกรายโรค (./../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=e5f745095237e53e876b543311299c7e) (./../warehouse/export_s_txt.php?id=e5f745095237e53e876b543311299c7e) **2** **0** **0.00**
- ▶ 6.5. เด็กพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I และได้รับการวินิจฉัยจำแนกรายโรค (./../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=6b6473582a0f78f6129786acab9f98bb) (./../warehouse/export_s_txt.php?id=6b6473582a0f78f6129786acab9f98bb)
- ▶ 6.6. เด็กพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ครบเกณฑ์ และได้รับการวินิจฉัยจำแนกรายโรค (./../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=b6ff4ab3786a061425d8a7e6800d8556) (./../warehouse/export_s_txt.php?id=b6ff4ab3786a061425d8a7e6800d8556)


▶ 6.7. เด็กพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ครบเกณฑ์และยังมีพัฒนาการล่าช้า ที่ได้รับการวินิจฉัยจำแนกรายโรค (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=2ccbecef2be012242b9ad6e6d0f697fe)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=2ccbecef2be012242b9ad6e6d0f697fe)

▶ 6.8. ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42,60 เดือนที่คัดกรองพัฒนาการแล้วพบว่า มีพัฒนาการล่าช้าที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น(ไม่นับเด็กป่วย) (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=331c59cb8bee9501d25e94460a0898ab)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=331c59cb8bee9501d25e94460a0898ab) **2** **0** **0.00**

7. ข้อมูลเชื่อมโยง >>เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กรมกิจการเด็กและเยาวชน)

▶ 7.1. เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ DSPM (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=42d07f6b856170ea71d6ad3110ccbb0c)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=42d07f6b856170ea71d6ad3110ccbb0c) **604** **93** **15.40**

▶ 7.2. ร้อยละเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กรมกิจการเด็กและเยาวชน) ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขได้ (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=7aab62f93db4dd0a5f68618959d24c12)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=7aab62f93db4dd0a5f68618959d24c12)

▶ 7.3. สถานะสุขภาพของเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กรมกิจการเด็กและเยาวชน) ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขได้ (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=1ed90bc32310b503b7ca9b32af425ae5&id=c465f14cc9598a27564fb5aa85bb4150)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=c465f14cc9598a27564fb5aa85bb4150)



ชื่อรายงาน

เป้าหมาย

ผลงาน

อัตรา

1. กลุ่มอายุ 1 ปี

- ▶ 1.1. ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน BCG ,HBV1,DTP1,DTP3,HBV3,Hib3,โปลิโอ3, MMR1,IPV,Rota รายไตรมาส (././reports/report.php?

source=epi/epi_1.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=c88658f4d09acb8c76e6c06ffb58ebaf)



(././warehouse/export_s_txt.php?id=c88658f4d09acb8c76e6c06ffb58ebaf)

- ▶ 1.2. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี (fully immunized) (././reports/report.php?source=epi/epi_complete.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde)



(././warehouse/export_s_txt.php?id=28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde)

- ▶ 1.3. การให้บริการวัคซีนในเด็กกลุ่มอายุ 0-1 ปี จำนวนรายวัคซีน (work load) (././reports/report.php?source=pformatted/format2.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=f4506e8c2f2ba1a75dabaedae59fba63)



(././warehouse/export_s_txt.php?id=f4506e8c2f2ba1a75dabaedae59fba63)

2. กลุ่มอายุ 2 ปี

- ▶ 2.1. ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 2 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP4,โปลิโอ4,JE รายไตรมาส (././reports/report.php?source=epi/epi_2.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=71e49e4b61aafef17761601c506d5f85)



(././warehouse/export_s_txt.php?id=71e49e4b61aafef17761601c506d5f85)

- ▶ 2.2. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 2 ปี (fully immunized) (././reports/report.php?source=epi/epi_complete.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551)



(././warehouse/export_s_txt.php?id=35f4a8d465e6e1edc05f3d8ab658c551)

- ▶ 2.3. การให้บริการวัคซีนในเด็กกลุ่มอายุ 1-2 ปี จำนวนรายวัคซีน (work load) (././reports/report.php?source=pformatted/format2.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=296c7d77c9b1696ca2b3e32bbd92b17a)



(././warehouse/export_s_txt.php?id=296c7d77c9b1696ca2b3e32bbd92b17a)

3. กลุ่มอายุ 3 ปี

- ▶ 3.1. ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE,MMR2 รายไตรมาส (././reports/report.php?source=epi/epi_3.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=267ce09f2a704eb7783997e25d1f18ba)



(././warehouse/export_s_txt.php?id=267ce09f2a704eb7783997e25d1f18ba)

- ▶ 3.2. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 3 ปี (fully immunized) (././reports/report.php?source=epi/epi_complete.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=d1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7)



(././warehouse/export_s_txt.php?id=d1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7)

- ▶ 3.3. การให้บริการวัคซีนในเด็กกลุ่มอายุ 2-3 ปี จำนวนรายวัคซีน (work load) (././reports/report.php?source=pformatted/format2.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=78a05f79f6828608f3c43f69dea011df)



(././warehouse/export_s_txt.php?id=78a05f79f6828608f3c43f69dea011df)

4. กลุ่มอายุ 5 ปี

- ▶ 4.1. ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 5 ปีที่ได้รับวัคซีน DTP5, โปลิโอ5 รายไตรมาส (./../reports/report.php?source=epi/epi_5.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=c47283d3c2c1e6528ddcf88c254f21b3)



(./../warehouse/export_s_txt.php?id=c47283d3c2c1e6528ddcf88c254f21b3)

- ▶ 4.2. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 5 ปี (fully immunized) (./../reports/report.php?source=epi/epi_complete.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=f033ab37c30201f73f142449d037028d)



(./../warehouse/export_s_txt.php?id=f033ab37c30201f73f142449d037028d)

- ▶ 4.3. การให้บริการวัคซีนในเด็กกลุ่มอายุ 3-5 ปี จำนวนรายวัคซีน (work load) (./../reports/report.php?source=pformatted/format2.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=d597377673b27843ffbf1a9b8c0f268e)



(./../warehouse/export_s_txt.php?id=d597377673b27843ffbf1a9b8c0f268e)

5. กลุ่มวัยเรียน

- ▶ 5.1. การให้บริการวัคซีนในเด็กนักเรียนชั้น ป.1 จำนวนรายวัคซีน (work load) (./../reports/report.php?source=pformatted/format2.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=185b8eca91142a150b439c6489e05cf1)



(./../warehouse/export_s_txt.php?id=185b8eca91142a150b439c6489e05cf1)

- ▶ 5.2. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 7 ปี (fully immunized) (./../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=30f72fc853a2cc02ef953dc97f36f596)



(./../warehouse/export_s_txt.php?id=30f72fc853a2cc02ef953dc97f36f596)

309

284

91.91

- ▶ 5.3. การได้รับวัคซีนเอชพีวีในเด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5 (work load) (./../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=e538807db775e8b3185b6b783651c0eb)



(./../warehouse/export_s_txt.php?id=e538807db775e8b3185b6b783651c0eb)

- ▶ 5.4. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนเอชพีวีในเด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5 (./../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=163944c7bb609801325653aa36cc71a4)



(./../warehouse/export_s_txt.php?id=163944c7bb609801325653aa36cc71a4)

- ▶ 5.5. การได้รับวัคซีน dT ในเด็กนักเรียนชั้น ป.6 (work load) (./../reports/report.php?source=pformatted/epi_student.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=8ab007477c3a889fdb1652db9992a7f0)



(./../warehouse/export_s_txt.php?id=8ab007477c3a889fdb1652db9992a7f0)

- ▶ 5.6. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน dT ในเด็กนักเรียนชั้น ป.6 (./../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=c487348321b7c88e1c83f6e1bc8a578d)



(./../warehouse/export_s_txt.php?id=c487348321b7c88e1c83f6e1bc8a578d)

- ▶ 5.7. ผลการให้บริการวัคซีนรณรงค์/เก็บตก/ควบคุมโรคในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (./../reports/report.php?source=pformatted/format2.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=a7989c99fc3d9e85ed1a0cf5cbc719a5)



(./../warehouse/export_s_txt.php?id=a7989c99fc3d9e85ed1a0cf5cbc719a5)

6. กลุ่มผู้ใหญ่

- ▶ 6.1. การได้รับวัคซีน dT/Tdap ในผู้ใหญ่ (work load) (./../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=5f487c986a93861d388bf44c07dd633a)



(./../warehouse/export_s_txt.php?id=5f487c986a93861d388bf44c07dd633a)

- ▶ 6.2. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ในผู้ใหญ่ (./../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=9b0fea7bf685bc46bfdf280101366bb)




(./../warehouse/export_s_txt.php?id=9b0fea7bf685bc46bfdf280101366bb)


1,827


58


3.17


- ▶ 6.3. การได้รับวัคซีนเข็ม-เข็มแรกในนักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข (work load) (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=6bb04eb8f47742f8b524c140f74d6b15)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=6bb04eb8f47742f8b524c140f74d6b15)


7. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์

- ▶ 7.1. ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนไขหวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์ (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=ea6b871062cf252c0743a5ecde01c759)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=ea6b871062cf252c0743a5ecde01c759) **23** **17** **73.91**


- ▶ 7.2. การได้รับวัคซีนไขหวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์ (work load) (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=e133f69c9c82e1fb56ca9209d697abb3)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=e133f69c9c82e1fb56ca9209d697abb3)


- ▶ 7.3. การได้รับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT) ในหญิงตั้งครรภ์ (work load) (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=1ac2b627bf3acbbbe52696f27dd6df48)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=1ac2b627bf3acbbbe52696f27dd6df48) **23** **8** **34.78**

- ▶ 7.4. ความครอบคลุมวัคซีน Pertussis(ap/Tdap) ในหญิงตั้งครรภ์ (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=65558fe365a160f748118cd7b2937f53)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=65558fe365a160f748118cd7b2937f53) **23** **0** **0.00**

- ▶ 7.5. การได้รับวัคซีน Pertussis(ap/Tdap) ในหญิงตั้งครรภ์ (work load) (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=39efe88bf155353e91f7267908eaf702)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=39efe88bf155353e91f7267908eaf702)

8. กลุ่มวัคซีนरणรงค์

- ▶ 8.1. จำนวนผู้รับบริการวัคซีนไขหวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มผู้รับบริการ (work load) (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=c7e7a388a4dc1a4e3af810ca84ebadf8)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=c7e7a388a4dc1a4e3af810ca84ebadf8)

- ▶ 8.2. จำนวนประชากรเป้าหมายในการฉีดวัคซีนโควิด 19 (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=4df360514655f79f13901ef1181ca1c7&id=a5232dd45090422b9383b6896394e4b7)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=a5232dd45090422b9383b6896394e4b7)




ชื่อรายงาน

เป้าหมาย

ผลงาน

อัตรา

1. การคัดกรองความดันโลหิตสูง ในประชากรไทย จำแนกกลุ่มอายุ (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=6966b0664b89805a484d7ac96c6edc48&id=68e401815a64e624c286d97ef3582aa3)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=68e401815a64e624c286d97ef3582aa3)			
2. ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=6966b0664b89805a484d7ac96c6edc48&id=6833128a5d76a6afcae3e4a6af0e718c)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=6833128a5d76a6afcae3e4a6af0e718c)	16,367	12,769	78.02
3. การเข้าถึงบริการและการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง (././reports/report.php?source=formatted/visit_screen_ht.php&cat_id=6966b0664b89805a484d7ac96c6edc48&id=726942e401ef74754a45cd15f30ed02e)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=726942e401ef74754a45cd15f30ed02e)	16,367	12,723	77.74
4. การคัดกรองเบาหวานในประชากรไทย จำแนกกลุ่มอายุ (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=6966b0664b89805a484d7ac96c6edc48&id=150edaa99ecbe538378b8150e0776763)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=150edaa99ecbe538378b8150e0776763)			
5. ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน (././reports/report.php?source=formatted/screen_risk.php&cat_id=6966b0664b89805a484d7ac96c6edc48&id=323a75335033c5976566d99f5ad53b33)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=323a75335033c5976566d99f5ad53b33)	18,115	13,985	77.20
6. การเข้าถึงบริการและการคัดกรองโรคเบาหวาน (././reports/report.php?source=formatted/visit_screen_dm.php&cat_id=6966b0664b89805a484d7ac96c6edc48&id=d7e91cec5aca74419bd84b1da4dc266f)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=d7e91cec5aca74419bd84b1da4dc266f)	18,115	13,929	76.89
7. อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปี (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=6966b0664b89805a484d7ac96c6edc48&id=4eab25b045dc0a9453d85c98dc2fdef0)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=4eab25b045dc0a9453d85c98dc2fdef0)	7,427	2,303	31.01
8. อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=6966b0664b89805a484d7ac96c6edc48&id=308526013808e90ce8f30d66e3b5ad82)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=308526013808e90ce8f30d66e3b5ad82)	9,879	2,273	23.01
9. ความชุกผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 - 19 ปี (././reports/report.php?source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=6966b0664b89805a484d7ac96c6edc48&id=68345e9bd757bdf07d0d7fc71bee68f)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=68345e9bd757bdf07d0d7fc71bee68f)	2,129	5	0.23
10. ร้อยละของ Healthy Ageing (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=6966b0664b89805a484d7ac96c6edc48&id=bbcb40adb960e0564efba686c316c009)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=bbcb40adb960e0564efba686c316c009)			
11. จำนวนผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำแนกตามความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=6966b0664b89805a484d7ac96c6edc48&id=953a2fc648be8ce76a8115fbb955bb51)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=953a2fc648be8ce76a8115fbb955bb51)	10,391	6,439	61.97
12. การคัดกรองผู้สูงอายุ 10 เรื่อง (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=6966b0664b89805a484d7ac96c6edc48&id=df0700e8e3c79802b208b8780ab64d61)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=df0700e8e3c79802b208b8780ab64d61)			
13. การคัดกรองผู้สูงอายุ 9 ด้าน (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=6966b0664b89805a484d7ac96c6edc48&id=aa86b13e8cb60cae6c3216b7e3e5f151)					

 (../warehouse/export_s_txt.php?id=aa86b13e8cb60cae6c3216b7e3e5f151)



ชื่อรายงาน

เป้าหมาย

ผลงาน

อัตรา

1. หญิงตั้งครรภ์

▶ 1.1. ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ (././reports/report.php?

source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=9024b8ee2bd07548c8f12517eb3021e6)

 (././warehouse/export_s_txt.php?id=9024b8ee2bd07548c8f12517eb3021e6) **13** **0** **0.00**

▶ 1.2. ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 32-34 สัปดาห์ (././reports/report.php?

source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=25ffbd4bcf049baa8a8a7a6c2caeadc7)

 (././warehouse/export_s_txt.php?id=25ffbd4bcf049baa8a8a7a6c2caeadc7) **5** **0** **0.00**

▶ 1.3. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก (././reports/report.php?

source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=422edc9d4d81d5c943a8ca9029f20e78)

(././warehouse/export_s_txt.php?id=422edc9d4d81d5c943a8ca9029f20e78)

93 **93** **100.00**

▶ 1.4. ความครอบคลุมการได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก ของหญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ (././reports/report.php?

source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=14b660d6a0005a2f788a1d73e3200df0)

 (././warehouse/export_s_txt.php?id=14b660d6a0005a2f788a1d73e3200df0) **23** **22** **95.65**

▶ 1.5. อายุครรภ์เฉลี่ยของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ (././reports/report.php?

source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=160d649b43bf6cc6583f07142a24d1e0)

(././warehouse/export_s_txt.php?id=160d649b43bf6cc6583f07142a24d1e0)

▶ 1.6. ร้อยละของหญิงที่คลอดบุตรแล้วในเขตรับผิดชอบมีภาวะโลหิตจาง (././reports/report.php?

source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=9ed3d3e2961560d99f6ff49844c46235)

 (././warehouse/export_s_txt.php?id=9ed3d3e2961560d99f6ff49844c46235) **23** **0** **0.00**

2. เด็กอายุ 0-2 ปี

▶ 2.1. ร้อยละของเด็ก 0 - 2 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยเด็กอายุ 2 ปี (././reports/report.php?

source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=df12bdd1a98ec0306ad71b914356f313)

(././warehouse/export_s_txt.php?id=df12bdd1a98ec0306ad71b914356f313)

▶ 2.2. ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0 - 2 ปี ดัชนีน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ (././reports/report.php?

source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=bd1e229567f454e624876b24b994644a)

(././warehouse/export_s_txt.php?id=bd1e229567f454e624876b24b994644a)

▶ 2.3. ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0 - 2 ปี ดัชนีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (ภาวะเตี้ย) (././reports/report.php?

source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=b353351a93d62075b234e3fee545e328)

(././warehouse/export_s_txt.php?id=b353351a93d62075b234e3fee545e328)

▶ 2.4. ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0 - 2 ปี ดัชนีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (ภาวะผอม สมส่วน ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน)

(././reports/report.php?


source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=8189e9a96e80298c71924cc2cab4bcb6)


(././warehouse/export_s_txt.php?id=8189e9a96e80298c71924cc2cab4bcb6)


3. เด็กอายุ 3-5 ปี


▶ 3.1. ร้อยละของเด็ก 3 - 5 ปี สูงดีสมส่วน (././reports/report.php?

source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=b86aa996a4d38717de811ed5d04663d5)


 (../warehouse/export_s_txt.php?id=b86aa996a4d38717de811ed5d04663d5)


▶ 3.2. ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 3 - 5 ปี ดัชนีน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ (../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=d4f510737ccd17103cc998cdf8a92d05)
 (../warehouse/export_s_txt.php?id=d4f510737ccd17103cc998cdf8a92d05)


▶ 3.3. ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 3 - 5 ปี ดัชนีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (ภาวะเต็ม) (../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=c66a04de8deffe6d6f7cfd7422006545)
 (../warehouse/export_s_txt.php?id=c66a04de8deffe6d6f7cfd7422006545)


▶ 3.4. ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 3-5 ปี ดัชนีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (ภาวะผอม สมส่วน ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน) (../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=b85447e35e7b8288aa76e9e9cdd357c3)
 (../warehouse/export_s_txt.php?id=b85447e35e7b8288aa76e9e9cdd357c3)


4. เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี

▶ 4.1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=67e41dbb1ce5d844d49f6b7b10e30d01)
 (../warehouse/export_s_txt.php?id=67e41dbb1ce5d844d49f6b7b10e30d01)


▶ 4.2. ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ดัชนีน้ำหนักตามเกณฑ์อายุ (../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=02db515d852ee58f845b58cb90b037cf)
 (../warehouse/export_s_txt.php?id=02db515d852ee58f845b58cb90b037cf)


▶ 4.3. ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ดัชนีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (ภาวะเต็ม) (../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=7190b07ced690add4560887aa2bff5ac)
 (../warehouse/export_s_txt.php?id=7190b07ced690add4560887aa2bff5ac)

▶ 4.4. ภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ดัชนีน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (ภาวะผอม สมส่วน ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน) (../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=94698146861c48e7d45dd1e186f9b7b1)
 (../warehouse/export_s_txt.php?id=94698146861c48e7d45dd1e186f9b7b1)


▶ 4.5. ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ใ้ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก (../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=1fe1b6263a1db45127a7841704e0ca77)
 (../warehouse/export_s_txt.php?id=1fe1b6263a1db45127a7841704e0ca77) **164** **120** **73.17**


5. เด็กอายุ 6-14 ปี

▶ 5.1. ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปี (../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=e28682b2718e6cc82b8dbb3e00f2e28e)
 (../warehouse/export_s_txt.php?id=e28682b2718e6cc82b8dbb3e00f2e28e)


▶ 5.2. ร้อยละเด็กอายุ 6 - 12 ปี ใ้ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก (../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=99a9ae5b11353e27cbe21d898020c3a8)
 (../warehouse/export_s_txt.php?id=99a9ae5b11353e27cbe21d898020c3a8)


6. วัยรุ่น


▶ 6.1. ร้อยละวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 18 ปี (../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=9b019d9cc12576000e6e84acfb9ad7f0)
 (../warehouse/export_s_txt.php?id=9b019d9cc12576000e6e84acfb9ad7f0)


- ▶ 6.2. ส่วนสูงเฉลี่ยของคนไทยที่อายุ 19 ปี (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=b847780d347bdf9b7fd499357785720d)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=b847780d347bdf9b7fd499357785720d)


7. วิทยากร อายุ 18-59 ปี


- ▶ 7.1. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=64baebe49ae9f932bdde7660b8ff9d0d)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=64baebe49ae9f932bdde7660b8ff9d0d) **8,616** **3,551** **41.21**


- ▶ 7.2. ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ(Work Load) (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=4dafb23859b224fd8a1658afe554fd57)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=4dafb23859b224fd8a1658afe554fd57) **10,237** **4,251** **41.53**


- ▶ 7.3. ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=d91ad690b32234bcabc4668e2cf9c7c0)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=d91ad690b32234bcabc4668e2cf9c7c0) **441** **219** **49.66**


- ▶ 7.4. ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนกลาง อายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=e2d0b1a802a956529b7d1d0f9516313f)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=e2d0b1a802a956529b7d1d0f9516313f) **3,035** **1,387** **45.70**


- ▶ 7.5. ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนปลาย อายุ 45-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=efae3cce1325b28f558c73725e6077d2)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=efae3cce1325b28f558c73725e6077d2) **6,761** **2,645** **39.12**

- ▶ 7.6. ร้อยละของประชากรวัยทำงาน อายุ 18 - 59 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=ee42e99e5869cb4e2d2aa39a5f11d057)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=ee42e99e5869cb4e2d2aa39a5f11d057) **8,618** **4,388** **50.92**


- ▶ 7.7. ร้อยละของประชากรวัยทำงาน อายุ 18 - 59 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ (Work Load) (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=dc4b0430aee48143867d95f8a6be9d75)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=dc4b0430aee48143867d95f8a6be9d75) **10,239** **5,346** **52.21**


- ▶ 7.8. ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=319a7899c03b1d07c5d6c34d28b63965)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=319a7899c03b1d07c5d6c34d28b63965) **442** **313** **70.81**

- ▶ 7.9. ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนกลาง อายุ 30-44 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=13ab7a06119fac83195261fb634ac369)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=13ab7a06119fac83195261fb634ac369) **3,032** **1,748** **57.65**


- ▶ 7.10. ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนปลาย อายุ 45-59 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=f826eb70c6a68f4fe4d269dee8398b99)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=f826eb70c6a68f4fe4d269dee8398b99) **6,765** **3,285** **48.56**

8. วิทยุสูงอายุ

- ▶ 8.1. ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=107330d691031cbddb95aa959a70d360)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=107330d691031cbddb95aa959a70d360) **10,393** **3,061** **29.45**



- ▶ 8.2. ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (Work Load) (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=df704ad2a71a171b6109731a8a5c97b3)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=df704ad2a71a171b6109731a8a5c97b3) **7,334** **3,175** **43.29**

▶ 8.3. ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีเส้นรอบเอวปกติ (./../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=46522b5bd1e06d24a5bd81917257a93c&id=d47a352dfe62c487b52f9dbbe30f2bfb)

 (./../warehouse/export_s_txt.php?id=d47a352dfe62c487b52f9dbbe30f2bfb) **7,354** **3,467** **47.14**



ชื่อรายงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	อัตรา
<p>1. ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=bebf866fceaef84c4078965eaf619565&id=4164a7c49fcb2b8c3ccca67dcdf28bd0)</p> <p>  (././warehouse/export_s_txt.php?id=4164a7c49fcb2b8c3ccca67dcdf28bd0)</p>	81	73	90.12
<p>2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ชาติเหล็ก และกรดโฟลิก (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=bebf866fceaef84c4078965eaf619565&id=422edc9d4d81d5c943a8ca9029f20e78)</p> <p>  (././warehouse/export_s_txt.php?id=422edc9d4d81d5c943a8ca9029f20e78)</p>	93	93	100.00
<p>3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=bebf866fceaef84c4078965eaf619565&id=67e41dbb1ce5d844d49f6b7b10e30d01)</p> <p> (././warehouse/export_s_txt.php?id=67e41dbb1ce5d844d49f6b7b10e30d01)</p>			
<p>4. ร้อยละเด็กปฐมวัยมีภาวะเตี้ย (Work Load) (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=bebf866fceaef84c4078965eaf619565&id=764b2e63b0ca3754f85e7b8b2cc5e9f9)</p> <p> (././warehouse/export_s_txt.php?id=764b2e63b0ca3754f85e7b8b2cc5e9f9)</p>			
<p>5. ร้อยละเด็กปฐมวัยมีภาวะพอม (Work Load) (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=bebf866fceaef84c4078965eaf619565&id=4067e70ea9a7b37cb6ecc32ec3bd686b)</p> <p> (././warehouse/export_s_txt.php?id=4067e70ea9a7b37cb6ecc32ec3bd686b)</p>			
<p>6. เด็กปฐมวัยมีภาวะอ้วน ไม่นเกินร้อยละ 10 (Work Load) (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=bebf866fceaef84c4078965eaf619565&id=d448e02a391064fe1ae015c7f8d3b26c)</p> <p> (././warehouse/export_s_txt.php?id=d448e02a391064fe1ae015c7f8d3b26c)</p>			
<p>7. ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปี (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=bebf866fceaef84c4078965eaf619565&id=e28682b2718e6cc82b8dbb3e00f2e28e)</p> <p> (././warehouse/export_s_txt.php?id=e28682b2718e6cc82b8dbb3e00f2e28e)</p>			
<p>8. ร้อยละวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 18 ปี (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=bebf866fceaef84c4078965eaf619565&id=9b019d9cc12576000e6e84acfb9ad7f0)</p> <p> (././warehouse/export_s_txt.php?id=9b019d9cc12576000e6e84acfb9ad7f0)</p>			
<p>9. การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=bebf866fceaef84c4078965eaf619565&id=df9f540b5d9e30948ffa2d0f4fd88a82)</p> <p> (././warehouse/export_s_txt.php?id=df9f540b5d9e30948ffa2d0f4fd88a82)</p>	1,066	0	0.00
<p>10. การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=bebf866fceaef84c4078965eaf619565&id=1336d766d29c4a739ed33ff9f4e79d83)</p> <p> (././warehouse/export_s_txt.php?id=1336d766d29c4a739ed33ff9f4e79d83)</p>	1,068	1	0.94
<p>11. ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=bebf866fceaef84c4078965eaf619565&id=4f7d8042fb0a064b25f29a48f6ccd23f)</p> <p> (././warehouse/export_s_txt.php?id=4f7d8042fb0a064b25f29a48f6ccd23f)</p>	1	0	0.00
<p>12. ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนกลาง อายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=bebf866fceaef84c4078965eaf619565&id=e2d0b1a802a956529b7d1d0f9516313f)</p>			

 (././warehouse/export_s_txt.php?id=e2d0b1a802a956529b7d1d0f9516313f)	3,035	1,387	45.70
<hr/>			
13. OHSP ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีพื้นที่ทำงานได้ไม่น้อยกว่า 20 ไร่ (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=bebf866fceaef84c4078965eaf619565&id=0317b7abf99b89c45555e97e19c4cb21)			
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=0317b7abf99b89c45555e97e19c4cb21)	299	179	59.87








ชื่อรายงาน





เป้าหมาย

ผลงาน

อัตรา

1. การคัดกรองความเครียด(ST-5)ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=574437c29aff8d1709da55677abc4b03&id=795a4a9ce9dc5906f7a3c866ec363913)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=795a4a9ce9dc5906f7a3c866ec363913)	7,353	239	3.25
2. การคัดกรองความเครียด(ST-5)ในหญิงตั้งครรภ์ (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=574437c29aff8d1709da55677abc4b03&id=7f4ebb6d63d2e3568f12c20e9a55b27a)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=7f4ebb6d63d2e3568f12c20e9a55b27a)	23	5	21.74
3. การคัดกรองความเครียด(ST-5)ในกลุ่มผู้สูงอายุ (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=574437c29aff8d1709da55677abc4b03&id=7bd56fb9f20abea2eb72dfca24155e6a)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=7bd56fb9f20abea2eb72dfca24155e6a)	10,391	225	2.17
4. การคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=574437c29aff8d1709da55677abc4b03&id=234d24523894e656f33260494dddd968)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=234d24523894e656f33260494dddd968)	7,353	3,132	42.59
5. การคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ในหญิงตั้งครรภ์ (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=574437c29aff8d1709da55677abc4b03&id=a1178e45c0788dd30dc9361569b6a5cd)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=a1178e45c0788dd30dc9361569b6a5cd)	23	10	43.48
6. การคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ในกลุ่มผู้สูงอายุ (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=574437c29aff8d1709da55677abc4b03&id=8f104b5d2848b8a05a487205f0287991)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=8f104b5d2848b8a05a487205f0287991)	10,393	6,544	62.97
7. การประเมินโรคซึมเศร้า (9Q) ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=574437c29aff8d1709da55677abc4b03&id=46a3841a0ccaca9ac890bd891e30848f)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=46a3841a0ccaca9ac890bd891e30848f)	1	0	0.00
8. การประเมินโรคซึมเศร้า (9Q) ในหญิงตั้งครรภ์ (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=574437c29aff8d1709da55677abc4b03&id=94b8a5d737d96ce04ea82f6aca6a7068)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=94b8a5d737d96ce04ea82f6aca6a7068)			
9. การประเมินโรคซึมเศร้า (9Q) ในกลุ่มผู้สูงอายุ (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=574437c29aff8d1709da55677abc4b03&id=1cabe82729905e268bb97fed7cb117dd)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=1cabe82729905e268bb97fed7cb117dd)	1	0	0.00
10. การประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q) ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=574437c29aff8d1709da55677abc4b03&id=49e6c2e9fb9ee2deb0639680325cfbcd)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=49e6c2e9fb9ee2deb0639680325cfbcd)			
11. การประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q) ในหญิงตั้งครรภ์ (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=574437c29aff8d1709da55677abc4b03&id=3d14b2605c124a5013c1fb508a26c915)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=3d14b2605c124a5013c1fb508a26c915)			
12. การประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q) ในกลุ่มผู้สูงอายุ (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=574437c29aff8d1709da55677abc4b03&id=ba59f01298b420b859a93124cc250d41)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=ba59f01298b420b859a93124cc250d41)			

13. การได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19


-
- ▶ 13.1. ร้อยละผู้ป่วยจิตเวชตามภูมิภาคที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 อย่างน้อย 3 เข็ม (./../reports/report.php?source=pformatted/formatg.php&cat_id=574437c29aff8d1709da55677abc4b03&id=f65f34f9f8eae331c9c7c1ed6fb4a765)
 (./../warehouse/export_s_txt.php?id=f65f34f9f8eae331c9c7c1ed6fb4a765)
-
- ▶ 13.2. ร้อยละผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 อย่างน้อย 3 เข็ม จำแนกตามรหัสกลุ่มโรค/โรค (./../reports/report.php?source=pformatted/format2.php&cat_id=574437c29aff8d1709da55677abc4b03&id=754decbd5bd7153d236a218ea0de5770)
 (./../warehouse/export_s_txt.php?id=754decbd5bd7153d236a218ea0de5770)
-
- ▶ 13.3. จำนวนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 (เฉพาะหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต) จำแนกตามเข็ม (./../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=574437c29aff8d1709da55677abc4b03&id=ab4e8ebcc1a88a2da1ae1b7d95eec428)
 (./../warehouse/export_s_txt.php?id=ab4e8ebcc1a88a2da1ae1b7d95eec428)
-
- ▶ 13.4. จำนวนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 (เฉพาะหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต) จำแนกตามเดือน (./../reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=574437c29aff8d1709da55677abc4b03&id=b2c002e852543a40ea621062ae0e5076)
 (./../warehouse/export_s_txt.php?id=b2c002e852543a40ea621062ae0e5076)




ชื่อรายงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	อัตรา
1. OHSP อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการทันตกรรมรวมทุกสิทธิ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (../reports/report.php?source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=99ccd1e29a5cdb81256fb3fa587698ef) (../warehouse/export_s_txt.php?id=99ccd1e29a5cdb81256fb3fa587698ef)	31,704	2,155	6.80
2. OHSP อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการทันตกรรมสิทธิ UC เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (../reports/report.php?source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=00af52a6f2efcb52b48a2d51433cdaaa) (../warehouse/export_s_txt.php?id=00af52a6f2efcb52b48a2d51433cdaaa)	21,823	1,828	8.38
3. OHSP อัตรา (ร้อยละ) การการให้บริการ P&P เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (../reports/report.php?source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=bafe62ee021cc53306415b0fa0a2c049) (../warehouse/export_s_txt.php?id=bafe62ee021cc53306415b0fa0a2c049)	31,704	2,153	6.79
4. OHSP อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการทันตกรรมพื้นฐาน เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (../reports/report.php?source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=defb23a746850f247916f086644af5c0) (../warehouse/export_s_txt.php?id=defb23a746850f247916f086644af5c0)	31,704	588	1.85
5. OHSP อัตรา (ร้อยละ) การใช้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (../reports/report.php?source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=6c57c609054cf9a4111c2704fd2bbce1) (../warehouse/export_s_txt.php?id=6c57c609054cf9a4111c2704fd2bbce1)	31,704	49	0.15
6. OHSP อัตรา (ร้อยละ) การให้บริการ P&P ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (../reports/report.php?source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=1a888956dda87264ae6fd1e290d17d68) (../warehouse/export_s_txt.php?id=1a888956dda87264ae6fd1e290d17d68)	23	22	95.65
7. OHSP อัตรา (ร้อยละ) การให้บริการ P&P ในกลุ่มเด็กอายุ 0-2 ปี เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (../reports/report.php?source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=261d0c53638bf4c6cf2af32b677f6c35) (../warehouse/export_s_txt.php?id=261d0c53638bf4c6cf2af32b677f6c35)	560	122	21.79
8. OHSP อัตรา (ร้อยละ) การให้บริการ P&P ในกลุ่มเด็กอายุ 3-5 ปี เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (../reports/report.php?source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=743694135b213c08d3916bf14503aa70) (../warehouse/export_s_txt.php?id=743694135b213c08d3916bf14503aa70)	797	29	3.64
9. OHSP อัตรา (ร้อยละ) การให้บริการ P&P ในกลุ่มเด็กอายุ 6-12 ปี เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (../reports/report.php?source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=51b65857707cb843a0a2a97b5310a373) (../warehouse/export_s_txt.php?id=51b65857707cb843a0a2a97b5310a373)	2,695	73	2.71
10. OHSP อัตรา (ร้อยละ) การให้บริการ P&P ในกลุ่มผู้สูงอายุ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (../reports/report.php?source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=0282aaa7ea31ae081a80990adbd8ca1e) (../warehouse/export_s_txt.php?id=0282aaa7ea31ae081a80990adbd8ca1e)	10,397	1,441	13.86
11. OHSP ร้อยละ visit ตรวจฟันอย่างเดียว ต่อ visit ทั้งหมด (../reports/report.php?source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=53f0ff606ac8a9c99409f9ad0918dff1) (../warehouse/export_s_txt.php?id=53f0ff606ac8a9c99409f9ad0918dff1)	6,605	2,643	40.02

12. OHSP ร้อยละ visit ตรวจฟันอย่างเดียวโดยทันตบุคลากร ต่อ visit ทั้งหมด (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=4c3d9eebfc5ead04511f945f9025c518) (././warehouse/export_s_txt.php?id=4c3d9eebfc5ead04511f945f9025c518)	5,582	2,130	38.16
13. OHSP ร้อยละจำนวนรายบริการส่งเสริมป้องกันต่อบริการทั้งหมด (././reports/report.php?source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=1a26b9eb98385cdece32f6a7bcce1e2c) (././warehouse/export_s_txt.php?id=1a26b9eb98385cdece32f6a7bcce1e2c)	6,560	5,491	83.70
14. OHSP ร้อยละจำนวนรายบริการทันตกรรมพื้นฐานต่อบริการทั้งหมด (././reports/report.php?source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=9f3ca952aa7e77eb7e790c418a5ccb9c) (././warehouse/export_s_txt.php?id=9f3ca952aa7e77eb7e790c418a5ccb9c)	6,560	1,006	15.34
15. OHSP ร้อยละจำนวนรายบริการทันตกรรมเฉพาะทางต่อบริการทั้งหมด (././reports/report.php?source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=c533163ee460b95c16a63c1db970a387) (././warehouse/export_s_txt.php?id=c533163ee460b95c16a63c1db970a387)	6,560	63	0.96
16. OHSP จำนวนคนไข้ (ครั้ง) เฉลี่ย ต่อทันตบุคลากรต่อปี (././reports/report.php?source=kpi/kpi_dent1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=d585aa059fa2c91549854e9ed76412aa) (././warehouse/export_s_txt.php?id=d585aa059fa2c91549854e9ed76412aa)			
17. ผลการจัดบริการสุขภาพของปากตามกลุ่มเป้าหมาย			
▶ 17.1. OHSP ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (././reports/report.php?source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=dc5463af059cd3e6c55613fc418ce36e) (././warehouse/export_s_txt.php?id=dc5463af059cd3e6c55613fc418ce36e)	23	17	73.91
▶ 17.2. OHSP ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (././reports/report.php?source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=035b31a86062c6baa3c8d65eb8075b51) (././warehouse/export_s_txt.php?id=035b31a86062c6baa3c8d65eb8075b51)	23	22	95.65
▶ 17.3. OHSP ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการทันตกรรม (คน) (././reports/report.php?source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=6e9bfb9153694c8ba401ca36838c94de) (././warehouse/export_s_txt.php?id=6e9bfb9153694c8ba401ca36838c94de)	17	17	100.00
▶ 17.4. OHSP ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (././reports/report.php?source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=c314de5a8bd00380b4f4f5632d7bc324) (././warehouse/export_s_txt.php?id=c314de5a8bd00380b4f4f5632d7bc324)	560	76	13.57
▶ 17.5. OHSP ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครองได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control นับรวมฝึกผู้ปกครองทำความสะอาดช่องปาก เฉพาะเขต (././reports/report.php?source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=bac1a981ea682e99509ddeaafbe556112) (././warehouse/export_s_txt.php?id=bac1a981ea682e99509ddeaafbe556112)	560	112	20.00
▶ 17.6. OHSP ร้อยละเด็ก 0-2 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (././reports/report.php?source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=74ae1671d67390c0bc0bd734bb8fa219) (././warehouse/export_s_txt.php?id=74ae1671d67390c0bc0bd734bb8fa219)	560	72	12.86
▶ 17.7. OHSP ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับการทันตกรรม (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (././reports/report.php?source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=c7da7911b1c2c43f0cc756299db9e8a7) (././warehouse/export_s_txt.php?id=c7da7911b1c2c43f0cc756299db9e8a7)	560	112	20.00


▶ 17.8. OHSP ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (../reports/report.php? source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=e72fe87e1432da642b6c015c485176fa)		(../warehouse/export_s_txt.php?id=e72fe87e1432da642b6c015c485176fa)	797	18	2.26
▶ 17.9. OHSP ร้อยละเด็ก 3-5 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (../reports/report.php? source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=8ad1c0936b86f836295150428063820e)		(../warehouse/export_s_txt.php?id=8ad1c0936b86f836295150428063820e)	797	20	2.51
▶ 17.10. OHSP ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการทันตกรรม (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (../reports/report.php? source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=c8c0d3e8d8396d7ae66a19d83bb96a72)		(../warehouse/export_s_txt.php?id=c8c0d3e8d8396d7ae66a19d83bb96a72)	797	26	3.26
▶ 17.11. OHSP ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (../reports/report.php? source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=43ce04569a6a81b4577daa7e5dc07b3c)		(../warehouse/export_s_txt.php?id=43ce04569a6a81b4577daa7e5dc07b3c)	2,695	34	1.26
▶ 17.12. OHSP ร้อยละเด็ก 6 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันแท้ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (../reports/report.php? source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=e07a6ff3cd63d34a759be4bff5c1a4c6)		(../warehouse/export_s_txt.php?id=e07a6ff3cd63d34a759be4bff5c1a4c6)	325	0	0.00
▶ 17.13. OHSP ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการทันตกรรม (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (../reports/report.php? source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=34f8384163b3a218f0300448482d9b6e)		(../warehouse/export_s_txt.php?id=34f8384163b3a218f0300448482d9b6e)	2,695	72	2.67
▶ 17.14. OHSP ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (../reports/report.php? source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=cf714db04a8775d593e6a873d3dd3ea5)		(../warehouse/export_s_txt.php?id=cf714db04a8775d593e6a873d3dd3ea5)	3,265	167	5.11
▶ 17.15. OHSP ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน ได้รับการทันตกรรม (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (../reports/report.php? source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=b3e35fa01f74460fe482d5f6485c839e)		(../warehouse/export_s_txt.php?id=b3e35fa01f74460fe482d5f6485c839e)	3,265	441	13.51
▶ 17.16. OHSP ร้อยละผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่ ได้รับการบริการสุขภาพช่องปาก (คน) (../reports/report.php? source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=0d3de0e0d9ce579a7c92b33d16eb0c5d)		(../warehouse/export_s_txt.php?id=0d3de0e0d9ce579a7c92b33d16eb0c5d)	16	1	6.25
▶ 17.17. OHSP ร้อยละผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่อายุ 0-14 ปีได้รับการบริการสุขภาพช่องปาก (../reports/report.php? source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=48b5a243ce17e6899b87273f1ab2f166)		(../warehouse/export_s_txt.php?id=48b5a243ce17e6899b87273f1ab2f166)	9	1	11.11
▶ 17.18. OHSP ร้อยละผู้พิการได้รับการบริการสุขภาพช่องปาก (../reports/report.php? source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=a8ca3b76913c5c583fb22468430b2abd)		(../warehouse/export_s_txt.php?id=a8ca3b76913c5c583fb22468430b2abd)	1,245	126	10.12
▶ 17.19. OHSP ร้อยละเด็กพิการ 0 -14 ปีได้รับการบริการสุขภาพช่องปาก (คน)(ใช้แบบความครอบคลุม) (../reports/report.php? source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=3be21ad2024fc1b59af379460334cb50)		(../warehouse/export_s_txt.php?id=3be21ad2024fc1b59af379460334cb50)	10	1	10.00
▶ 17.20. OHSP ร้อยละผู้มีอายุ 15-59 ปี ได้รับการทันตกรรม (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (../reports/report.php? source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=b8c600c3da072c24b375b07c56fa43cf)					

 (././warehouse/export_s_txt.php?id=b8c600c3da072c24b375b07c56fa43cf) **16,303** **470** **2.88**

▶ 17.21. OHSP ร้อยละของกลุ่มก่อนวัยผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง PMDs (คน) (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=af2408900a6a2ed369b940680438785d)


 (././warehouse/export_s_txt.php?id=af2408900a6a2ed369b940680438785d) **377** **0** **0.00**

▶ 17.22. OHSP ร้อยละของกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรอง PMDs (คน) (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=9f51a01dc95a8e3dc8e76d64c9209b7b)

 (././warehouse/export_s_txt.php?id=9f51a01dc95a8e3dc8e76d64c9209b7b) **1,008** **0** **0.00**


▶ 17.23. OHSP ร้อยละของผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (././reports/report.php?

source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=1fb6b46f1d1fd42362f97072f4b3b653)

 (././warehouse/export_s_txt.php?id=1fb6b46f1d1fd42362f97072f4b3b653) **10,397** **301** **2.90**


▶ 17.24. OHSP ร้อยละของผู้สูงอายุใส่ฟันเทียม (CD, SD, TP) ตามความจำเป็นเฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (././reports/report.php?

source=kpi/kpi_dent.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=bd3a677e043a8d3aba1967db695f245e)

 (././warehouse/export_s_txt.php?id=bd3a677e043a8d3aba1967db695f245e) **32** **0** **0.00**

▶ 17.25. OHSP ร้อยละของผู้สูงอายุ ได้รับการบริการทันตกรรม (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (././reports/report.php?

source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=9a40129f2df2a139b7eb03dc9f684a6d)

 (././warehouse/export_s_txt.php?id=9a40129f2df2a139b7eb03dc9f684a6d) **10,397** **1,441** **13.86**

▶ 17.26. OHSP ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่ติดบ้าน ติดเตียงได้รับการบริการทันตกรรม (คน) (././reports/report.php?

source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=9e6655a9a4b4c6df08edaadd567a70f1)

 (././warehouse/export_s_txt.php?id=9e6655a9a4b4c6df08edaadd567a70f1) **287** **122** **42.51**

▶ 17.1. OHSP ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่ติดบ้าน ติดเตียงได้รับการตรวจช่องปาก (././reports/report.php?

source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=c9ce49af46e33befdb01b4630bb64fab)

 (././warehouse/export_s_txt.php?id=c9ce49af46e33befdb01b4630bb64fab) **287** **64** **22.30**

18. ข้อมูลสภาวะสุขภาพช่องปาก

▶ 18.2. OHSP ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 18 เดือนมีฟันผุในฟันน้ำนม (././reports/report.php?

source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=4e43533419bde49edb7bd419602d55dd)

 (././warehouse/export_s_txt.php?id=4e43533419bde49edb7bd419602d55dd) **11** **0** **0.00**


▶ 18.3. OHSP ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 3 ปีมีฟันผุในฟันน้ำนม (././reports/report.php?

source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=e9f3192f523c79cbbbcf7b405e879384)

 (././warehouse/export_s_txt.php?id=e9f3192f523c79cbbbcf7b405e879384) **2** **1** **50.00**


▶ 18.4. OHSP ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 6 ปีมีฟันผุในฟันแท้ (././reports/report.php?

source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=941d996a4de44b0f7b86d8e8e73ff957)

 (././warehouse/export_s_txt.php?id=941d996a4de44b0f7b86d8e8e73ff957) **1** **0** **0.00**

▶ 18.5. OHSP ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 9 ปีมีฟันผุในฟันแท้ (././reports/report.php?


source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=41b7969d64594d2649818b07a4842d55)


 (././warehouse/export_s_txt.php?id=41b7969d64594d2649818b07a4842d55) **5** **0** **0.00**


▶ 18.6. OHSP ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีมีฟันผุในฟันแท้ (././reports/report.php?


source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=35652a40027c24bbc3653428d3577b72)


 (././warehouse/export_s_txt.php?id=35652a40027c24bbc3653428d3577b72) **12** **9** **75.00**


▶ 18.7. OHSP ค่าเฉลี่ยฯ ถอน อุดในพื้นที่ กลุ่มอายุ 12 ปี (DMF) (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=88a6bba069c1619c2070477006d0c4b9)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=88a6bba069c1619c2070477006d0c4b9)


▶ 18.8. OHSP ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free) (คน) (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=d36f6c38999d128132513933e36a848a)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=d36f6c38999d128132513933e36a848a) **12** **4** **33.33**


▶ 18.9. OHSP ร้อยละของกลุ่มก่อนวัยสูงอายุ ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=ee3511e2fdc6bc7110db97960ce5cd23)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=ee3511e2fdc6bc7110db97960ce5cd23) **97** **91** **93.81**


▶ 18.10. OHSP ร้อยละของกลุ่มก่อนวัยสูงอายุ ที่มีฟันหลัง (แท้ หรือเทียม) ใช้งานที่เหมาะสม (ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ)
(././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=518211bd56dc0b4b610639010c7bf272)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=518211bd56dc0b4b610639010c7bf272) **97** **17** **17.53**

▶ 18.11. OHSP ร้อยละของกลุ่มก่อนวัยสูงอายุ ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง (แท้ หรือเทียม) ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่
สบ (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=47738d6b49f90e04485b2085b06e0d81)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=47738d6b49f90e04485b2085b06e0d81) **97** **17** **17.53**


▶ 18.12. OHSP ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=0317b7abf99b89c45555e97e19c4cb21)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=0317b7abf99b89c45555e97e19c4cb21) **299** **179** **59.87**


▶ 18.13. OHSP ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีฟันหลัง (แท้ หรือเทียม) ใช้งานที่เหมาะสม (ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ) (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=39d57bfb3574bce21ea236491e112820)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=39d57bfb3574bce21ea236491e112820) **299** **22** **7.36**


▶ 18.14. OHSP ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่มีฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ และฟันหลัง (แท้ หรือ เทียม) ใช้งานไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ
(././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=068491dac71f61ce79a9ea469a537a83)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=068491dac71f61ce79a9ea469a537a83) **299** **19** **6.35**

▶ 18.15. OHSP ร้อยละอำเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=9aa3ec7a10773b04ce35800578f75852)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=9aa3ec7a10773b04ce35800578f75852) **9** **0** **0.00**

19. งาน P&P สุขภาพช่องปาก ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการบางกลุ่มวัยเป็นการจำเพาะ

▶ 19.1. OHSP ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และขัดทำความสะอาดฟัน เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความ
ครอบคลุม) (././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=8897d18c21ad97d18cfb0a98abc5fb3f)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=8897d18c21ad97d18cfb0a98abc5fb3f) **42** **2** **4.76**

▶ 19.2. OHSP ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการ เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)
(././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=be5072b516aa3bc989be9780979314e6)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=be5072b516aa3bc989be9780979314e6) **3,235** **34** **1.05**

▶ 19.3. OHSP ร้อยละเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการ เคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)
(././reports/report.php?
source=pformatted/format1.php&cat_id=db30e434e30565c12fbac44958e338d5&id=8b6e9aa2219613b9b6443a7724b7fd04)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=8b6e9aa2219613b9b6443a7724b7fd04) **2,695** **4** **0.15**



ชื่อรายงาน

เป้าหมาย

ผลงาน

อัตรา

1. คัดกรอง/ค้นหาเสียงป่วยรายใหม่ (Coverage)

- ▶ 1.1. ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (././reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd2.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=0f6df79c2f8887f50d7879b5fe91c080)
↓ (././warehouse/export_s_txt.php?id=0f6df79c2f8887f50d7879b5fe91c080) **4,240** **2,040** **48.11**

- ▶ 1.2. ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่รอการยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรายใหม่ (././reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd2.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=dbec55e36330055a8cf0b6d05c2c354a)
↓ (././warehouse/export_s_txt.php?id=dbec55e36330055a8cf0b6d05c2c354a) **2,040** **470** **23.04**

- ▶ 1.3. ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังรายใหม่ (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=186c06d932b112d342a5c133fbb4ef75)
↓ (././warehouse/export_s_txt.php?id=186c06d932b112d342a5c133fbb4ef75) **2,040** **0** **0.00**

2. การชะลอความเสื่อมของไต (Work Load)

- ▶ 2.1. ผู้ป่วย CKD ที่มารับบริการ BP < 140/90 mmHg (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=776b34ed2b824e1dcd2dc245e61ad169)
↓ (././warehouse/export_s_txt.php?id=776b34ed2b824e1dcd2dc245e61ad169) **941** **399** **42.40**

- ▶ 2.2. ผู้ป่วย CKD ที่มารับบริการโรงพยาบาลได้รับ ACEi/ARB (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=7606d7f8e30d0fffcf0c2c3cffe2cd2b)
↓ (././warehouse/export_s_txt.php?id=7606d7f8e30d0fffcf0c2c3cffe2cd2b) **941** **547** **58.13**

- ▶ 2.3. ผู้ป่วย CKD มีอัตราการลดลงของ eGFR < 5 ml/min/1.73 m²/yr (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=d843f25a088253c22344d771113cf409)
↓ (././warehouse/export_s_txt.php?id=d843f25a088253c22344d771113cf409) **518** **406** **78.38**

- ▶ 2.4. ผู้ป่วย CKD ที่มารับบริการโรงพยาบาลได้รับการตรวจและมีระดับ Hb > 10 gm/dl หรือ Hct > 30% (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=e21ba0dbaac9b640cc6262f9b21dc399)
↓ (././warehouse/export_s_txt.php?id=e21ba0dbaac9b640cc6262f9b21dc399) **941** **1** **0.11**

- ▶ 2.5. ผู้ป่วย CKD(เฉพาะที่มีเบาหวานร่วม) ที่มารับบริการโรงพยาบาลได้รับการตรวจ HbA1c และมีค่าผลการตรวจตั้งแต่ 6.5% ถึง 7.5% (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=1734d4c14d93275a9b1ddc53d7591600)
↓ (././warehouse/export_s_txt.php?id=1734d4c14d93275a9b1ddc53d7591600) **661** **77** **11.65**

- ▶ 2.6. ผู้ป่วย CKD กลุ่มเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดและหัวใจได้รับยากลุ่ม Statin (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=cc417db46c6b7f713a205b27fec159bd)
↓ (././warehouse/export_s_txt.php?id=cc417db46c6b7f713a205b27fec159bd) **705** **330** **46.81**

- ▶ 2.7. ผู้ป่วย CKD ได้รับการตรวจ serum K และมีค่าผลการตรวจ < 5.5 mEq/L (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=a69f1a50b9ee7ae49a44d425269c1d20)
↓ (././warehouse/export_s_txt.php?id=a69f1a50b9ee7ae49a44d425269c1d20) **175** **171** **97.71**

- ▶ 2.8. ผู้ป่วย CKD ได้รับการตรวจ serum HCO₃ และมีค่าผลตรวจ > 22 mEq/L (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=1875e72cb83e331d141127ee68e3d0f8)
↓ (././warehouse/export_s_txt.php?id=1875e72cb83e331d141127ee68e3d0f8) **133** **111** **83.46**

▶ 2.9. ผู้ป่วย CKD ได้รับการตรวจ Urine protein (././reports/report.php?)

source=pformatted/format1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=3da103fdb473e0c80bccfac0b6f679f8)



(././warehouse/export_s_txt.php?id=3da103fdb473e0c80bccfac0b6f679f8)

941**554****58.87**

▶ 2.10. ผู้ป่วย CKD ได้รับการประเมิน UPCR (././reports/report.php?)

source=pformatted/format1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=897d580b7f1b25255ee9e37990a90247)



(././warehouse/export_s_txt.php?id=897d580b7f1b25255ee9e37990a90247)

941**0****0.00**

▶ 2.11. ผู้ป่วย CKD ได้รับการประเมิน UPCR และมีผลการประเมิน < 500 mg/g cr (././reports/report.php?)

source=pformatted/format1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=a15abbb8b6902587a438c1def3f52438)



(././warehouse/export_s_txt.php?id=a15abbb8b6902587a438c1def3f52438)

▶ 2.12. ผู้ป่วย CKD ได้รับการตรวจ Serum PO4 และมีผลการตรวจ ≤ 4.6 mg% (././reports/report.php?)

source=pformatted/format1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=e499211adbf86d218be6c91b4e4755fc)



(././warehouse/export_s_txt.php?id=e499211adbf86d218be6c91b4e4755fc)

▶ 2.13. ผู้ป่วย CKD ได้รับการตรวจ Serum iPTH และผลอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม(< 500) (././reports/report.php?)

source=pformatted/format1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=bb240224c08665a03347403a46193bee)



(././warehouse/export_s_txt.php?id=bb240224c08665a03347403a46193bee)

3. จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มารับบริการที่โรงพยาบาล จำแนกตาม Stage (Work Load) (././reports/report.php?)

source=pformatted/format1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=47a33f6886e36962dec4bb578819ba64)



(././warehouse/export_s_txt.php?id=47a33f6886e36962dec4bb578819ba64)

4. Stage Change ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง จำแนกตามโรงพยาบาลที่รักษา (Work Load) (././reports/report.php?)

source=pformatted/format1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=e69c7fae93eda2222aa210d5db512290)



(././warehouse/export_s_txt.php?id=e69c7fae93eda2222aa210d5db512290)

5. จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ จำแนกตาม Stage (Coverage) (././reports/report.php?)

source=pformatted/format1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=5d523ced4c9569123109fa6f4071d35f)



(././warehouse/export_s_txt.php?id=5d523ced4c9569123109fa6f4071d35f)



ชื่อรายงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	อัตรา
<p>1. ร้อยละการใช้จ่ายปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ระดับโรงพยาบาล (RI) (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=d8fa7339c10c7eccd02529be81ebb8a5)</p> <p> (././warehouse/export_s_txt.php?id=d8fa7339c10c7eccd02529be81ebb8a5)</p>	1,732	259	14.95
<p>2. ร้อยละการใช้จ่ายปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ระดับโรงพยาบาล (AD) (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=b307f1d136925d2c20940e5cc9c49ec7)</p> <p> (././warehouse/export_s_txt.php?id=b307f1d136925d2c20940e5cc9c49ec7)</p>	291	56	19.24
<p>3. ร้อยละการใช้จ่ายปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ระดับโรงพยาบาล (FTW) (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=1fa1fd876237284f018ec8356cad29b1)</p> <p> (././warehouse/export_s_txt.php?id=1fa1fd876237284f018ec8356cad29b1)</p>	472	191	40.47
<p>4. ร้อยละการใช้จ่ายปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกำหนดทางช่องคลอด ระดับโรงพยาบาล (APL) (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=bafab2dfb51f4042a3af4297a7a9fc8d)</p> <p> (././warehouse/export_s_txt.php?id=bafab2dfb51f4042a3af4297a7a9fc8d)</p>	16	1	6.25
<p>5. ร้อยละของผู้ป่วยความดันสูง (Essential hypertension) ที่ใช้ RAS blockade (ACEI/ ARB/ Renin inhibitor) 2 ชนิดร่วมกันในการรักษาภาวะความดันเลือดสูง (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=b4f7ec19819d99dc5bd04ae1815befdf)</p> <p> (././warehouse/export_s_txt.php?id=b4f7ec19819d99dc5bd04ae1815befdf)</p>	832	0	0.00
<p>6. ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานที่ใช้ยา metformin เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอื่นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล โดยไม่มีข้อห้ามใช้ (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=b122a679459b573dcc7cd08875ba1702)</p> <p> (././warehouse/export_s_txt.php?id=b122a679459b573dcc7cd08875ba1702)</p>	2,003	1,765	88.12
<p>7. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs ข้ำซ้อน (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=3214dc5ebe2f388fbbcdad2d773808425)</p> <p> (././warehouse/export_s_txt.php?id=3214dc5ebe2f388fbbcdad2d773808425)</p>	2,081	2	0.10
<p>8. ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึ้นไปที่ได้รับยา NSAIDs (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=b06c7547eb3aa2cb735999bfee7e0eee)</p> <p> (././warehouse/export_s_txt.php?id=b06c7547eb3aa2cb735999bfee7e0eee)</p>	585	3	0.51
9. ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคหืดที่ได้รับยา inhaled corticosteroid			
<p>▶ 9.1. ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคหืดที่ได้รับยา inhaled corticosteroid (PDx) (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=47a308b8cf31ef367bbfb0fe0fab8dd5)</p> <p> (././warehouse/export_s_txt.php?id=47a308b8cf31ef367bbfb0fe0fab8dd5)</p>	228	207	90.79
<p>▶ 9.2. ร้อยละของผู้ป่วยนอกโรคหืดที่ได้รับยา inhaled corticosteroid (All Dxtype) (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=46a60246b072c67f10fd4025e0f7934a)</p> <p> (././warehouse/export_s_txt.php?id=46a60246b072c67f10fd4025e0f7934a)</p>	265	236	89.06
<p>10. ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุที่ใช้ยาในกลุ่ม long-acting benzodiazepine ได้แก่ chlordiazepoxide, diazepam, dipotassium chlorazepate (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=e135d389fb049056ceb26d85668358ab)</p> <p> (././warehouse/export_s_txt.php?id=e135d389fb049056ceb26d85668358ab)</p>	10,209	5	0.05

11. จำนวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับยาที่ห้ามใช้ ได้แก่ ยา Warfarin หรือ Statins หรือ Ergots เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้ว (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=c38867aa715186862bbd55b35de4082b)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=c38867aa715186862bbd55b35de4082b)	96	0	0.00
12. ร้อยละครั้งบริการ (visit) ผู้ป่วยเด็ก ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจ และได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด non-sedating (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=79b7ac5f1354e27ae9f5a71af99189b9)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=79b7ac5f1354e27ae9f5a71af99189b9)	600	9	1.50
13. ร้อยละของโรงพยาบาล ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=0c4225465bf3b70c7359af42b8775ef6)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=0c4225465bf3b70c7359af42b8775ef6)	1	1	100.00
14. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ระดับ รพ.สต.(RI - PCU) (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=d1ccec314e92875acb5142769eb479a2)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=d1ccec314e92875acb5142769eb479a2)	978	13	1.33
15. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ระดับ รพ.สต. (AD - PCU) (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=2103caa0f068d4575720600d78d5ad65)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=2103caa0f068d4575720600d78d5ad65)	44	0	0.00
16. ร้อยละของรพ.สต. ที่มีอัตราการเข้ายาปฏิชีวนะในโรค Respiratory Infection และ Acute Diarrhea <= ร้อยละ20 ทั้ง 2 โรค (RUA PCU) (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=3328a9e3fe40877c45860265035e2412)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=3328a9e3fe40877c45860265035e2412)	9	9	100.00
17. ค่า Defined Daily Dose (DDD) ของยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานต่อ 1000 OP Visit แยกตามชื่อสามัญทางยา (Generic name) (././reports/report.php?source=pformatted/format2.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=ecb7af2dc881088d964f827317a563f4)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=ecb7af2dc881088d964f827317a563f4)			
18. ค่า Defined Daily Dose (DDD) ของยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานต่อ 1000 OP Visit แยกตามกลุ่มยา (Class) (././reports/report.php?source=pformatted/format2.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=63c6046a389a3cd9c69a432cf0ae783b)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=63c6046a389a3cd9c69a432cf0ae783b)			
19. ค่า Defined Daily Dose (DDD) รวมของยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานทุกรายการต่อ 1000 OP Visit (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=d8703771dee4e2f956ca7ba53abaae61)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=d8703771dee4e2f956ca7ba53abaae61)			
20. ค่า Defined Daily Dose (DDD) ของยาปฏิชีวนะชนิดฉีดที่ไขในผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admit) ต่อ 100 วันนอน แยกตามชื่อสามัญทางยา (Generic name) (././reports/report.php?source=pformatted/format2.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=343b3670ccb93a18bcc1951a41d239f5)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=343b3670ccb93a18bcc1951a41d239f5)			
21. ค่า Defined Daily Dose (DDD) ของยาปฏิชีวนะชนิดฉีดที่ไขในผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admit) ต่อ 100 วันนอน แยกตามกลุ่มยา (Class) (././reports/report.php?source=pformatted/format2.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=d58534279f78467bea5e48ae9cbd28ef)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=d58534279f78467bea5e48ae9cbd28ef)			
22. ค่า Defined Daily Dose (DDD) รวมของยาปฏิชีวนะชนิดฉีดทุกรายการที่ไขในผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admit) ต่อ 100 วันนอน (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=03b912ab9ccb4c07280a89bf05e5900e&id=36908f9f21f62f1acef7b2ea9fdefa5f)		(././warehouse/export_s_txt.php?id=36908f9f21f62f1acef7b2ea9fdefa5f)			



ชื่อรายงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	อัตรา
<p>1. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioid ในผู้ป่วยระดับประคองอย่างมีคุณภาพ (././reports/report.php? source=pformatted/format1.php&cat_id=b08560518ca0ebcaf2016dab69fb38b5&id=28e3ca2ae78a73a2b3d37a7d16f02d7d)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=28e3ca2ae78a73a2b3d37a7d16f02d7d)</p>	26	10	38.46
<p>2. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioid ในผู้ป่วยระดับประคอง และได้รับการเยี่ยมบ้าน (././reports/report.php? source=pformatted/format1.php&cat_id=b08560518ca0ebcaf2016dab69fb38b5&id=9cf44cb8bfb8c2a9f78846705758cf47)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=9cf44cb8bfb8c2a9f78846705758cf47)</p>	10	8	80.00
<p>3. ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆด้วย Strong Opioid ในผู้ป่วยระดับประคองอย่างมีคุณภาพในโรงพยาบาล(Work Load) (././reports/report.php? source=pformatted/format1.php&cat_id=b08560518ca0ebcaf2016dab69fb38b5&id=203af802132eb248d8bf1dac725113bf)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=203af802132eb248d8bf1dac725113bf)</p>	45	21	46.67
<p>4. ร้อยละการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคอง มีกิจกรรม Family Meeting และมีการทำ Advance Care Planning (ACP) ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว (././reports/report.php? source=pformatted/format1.php&cat_id=b08560518ca0ebcaf2016dab69fb38b5&id=a67ee74a4c0ff3c775b591be4ec80086)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=a67ee74a4c0ff3c775b591be4ec80086)</p>	73	34	46.58
<p>5. ร้อยละของผู้ป่วยระดับประคองที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน (././reports/report.php? source=pformatted/format1.php&cat_id=b08560518ca0ebcaf2016dab69fb38b5&id=8eb4ec8a40c080aadfdbb895be74e771)  (././warehouse/export_s_txt.php?id=8eb4ec8a40c080aadfdbb895be74e771)</p>	24	17	70.83



ชื่อรายงาน

เป้าหมาย

ผลงาน

อัตรา

1. มารดา(สูติกรรม)

▶ 1.1. การส่งต่อผู้ป่วย สาขาสูติกรรม จากรพช.แม่ข่าย (M2)Refer out ไป รพศ. /รพท. ลดลง (././reports/report.php?source=kpi/kpi_sp5.php&cat_id=3dc2d92087cdc5b585eb8c0904691399&id=ba39acd8980503ac2a5dd5ac492b21a5)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=ba39acd8980503ac2a5dd5ac492b21a5)

▶ 1.2. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลระดับ M2 (././reports/report.php?source=pformatted/formatg.php&cat_id=3dc2d92087cdc5b585eb8c0904691399&id=2ccc38fd75fbcf1037eacebaf991f165)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=2ccc38fd75fbcf1037eacebaf991f165)

▶ 1.3. ร้อยละของมารดาตายจากการตกเลือดหลังคลอด (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=3dc2d92087cdc5b585eb8c0904691399&id=60fbad7694636457cdb95f5615f65424)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=60fbad7694636457cdb95f5615f65424)

2. บุตร(กุมารเวชกรรม)

▶ 2.1. การส่งต่อผู้ป่วย สาขากุมารเวชกรรม จากรพช.แม่ข่าย (M2)Refer out ไป รพศ. /รพท. ลดลง (././reports/report.php?source=kpi/kpi_sp5.php&cat_id=3dc2d92087cdc5b585eb8c0904691399&id=2034b7f35a00a434c03c9d56935d05e5)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=2034b7f35a00a434c03c9d56935d05e5)

▶ 2.2. อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทย อายุ 1 เดือนถึง 5 ปีบริบูรณ์ ลดลงร้อยละ 10 (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=3dc2d92087cdc5b585eb8c0904691399&id=7e5ba3f0ff6590f168f967a3f355914a)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=7e5ba3f0ff6590f168f967a3f355914a) **15** **0** **0.00**

▶ 2.3. อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทย อายุ 1 เดือนถึง 1 ปีบริบูรณ์ (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=3dc2d92087cdc5b585eb8c0904691399&id=b2f9118d7117d220520dc55bfe145528)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=b2f9118d7117d220520dc55bfe145528) **2** **0** **0.00**

▶ 2.4. อัตราตายทารก อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=3dc2d92087cdc5b585eb8c0904691399&id=badaaceb3ffdc79b974b2c63d7119ad4)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=badaaceb3ffdc79b974b2c63d7119ad4) **17** **1** **58.82**



▶ 2.5. อัตราตายทารกไทย อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=3dc2d92087cdc5b585eb8c0904691399&id=522a7c48c3c831c62579427e8e29e714)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=522a7c48c3c831c62579427e8e29e714) **16** **1** **62.50**

▶ 2.6. อัตราป่วยตายของเด็กอายุ 0 – 15ปีที่ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=3dc2d92087cdc5b585eb8c0904691399&id=d9107db883059ad73d1de3314759fbd9)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=d9107db883059ad73d1de3314759fbd9) **67** **0** **0.00**

▶ 2.7. อัตราป่วยตายของเด็กอายุ 0 – 1ปีที่ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=3dc2d92087cdc5b585eb8c0904691399&id=8e5738efe6e8ef94ebdef63c24d817b4)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=8e5738efe6e8ef94ebdef63c24d817b4) **17** **0** **0.00**

▶ 2.8. อัตราป่วยตายของเด็กอายุ 0 – 5ปีที่ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=3dc2d92087cdc5b585eb8c0904691399&id=55c41fb0b40b2e079a818c5e2733f4d4)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=55c41fb0b40b2e079a818c5e2733f4d4) **29** **0** **0.00**

▶ 2.9. ลดอัตราการป่วยตายในเด็ก 0 - 4 ปี (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=3dc2d92087cdc5b585eb8c0904691399&id=50e159b6134121d55605dc856824d353)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=50e159b6134121d55605dc856824d353) **32** **1** **31.25**

-
- ▶ 2.10. อัตราการป่วยตายในเด็ก 1 เดือนถึง 4 ปีจากการบาดเจ็บกลุ่ม Trauma (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=3dc2d92087cdc5b585eb8c0904691399&id=9941e644b9c0b9c95ed1e1725a84f7a9)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=9941e644b9c0b9c95ed1e1725a84f7a9)
-
- ▶ 2.11. อัตราการป่วยตายในเด็ก 1 เดือนถึง 4 ปีจากโรคอื่นที่ไม่ใช่ การบาดเจ็บ non-trauma (././reports/report.php?source=pformatted/format1.php&cat_id=3dc2d92087cdc5b585eb8c0904691399&id=eb6791016b8bf9aef084f51e6969e46b)
 (././warehouse/export_s_txt.php?id=eb6791016b8bf9aef084f51e6969e46b)